



ДЕЙСТВИЕ

Действие наркотиков во многом зависит от дозы. Она различна в разных участках мозга. Эффект разных наркотиков также неравнозначен. Употребление легкого наркотика неизбежно заканчивается переходом к «тяжелым» (например, героину). **Согласно статистике, время от начала приема наркотиков до смерти (при отсутствии клинического лечения) не превышает 10-15 лет.** Поэтому старых наркоманов не бывает.





ЛЕЧЕНИЕ

На данный момент эффективное лечение наркомании включает в себя **три основных этапа**. **На первом этапе** человек проходит детоксикацию организма. Специалисты избавляют человека от ломки, восстанавливают работоспособность организма, аппетит, сон, обмен веществ. После этого человека отправляют на **следующий этап лечения** - реабилитацию. Здесь зависимый в безопасной обстановке избавляется от зависимости на психологическом уровне. И **заключительным этапом** является социальная адаптация - когда человек возвращается в привычный мир, только теперь уже полноценным человеком.





ПРИЗНАКИ

Условия, при которых человека следует считать наркоманом:

- непреодолимое влечение к яду;
- нарастающая толерантность - увеличение дозы;
- невозможность воздержаться, так как психически и физически человек настолько зависит от наркотика и его действия, что внезапное прекращение приема вызывает физически тяжелое, а психологически подчас невыносимое состояние («ломку»).





ГБУЗ "ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ" МЗ КК

НАРКОТИКИ

ПОСЛЕДСТВИЯ





ПОСЛЕДСТВИЯ

Длительное употребление наркотических препаратов приводит к общему **истощению, ослаблению организма, нарушениям деятельности желудочно-кишечного тракта, снижению и угасанию половой функции, ослаблению умственной деятельности, утрате способности к труду, общей слабости, раздражительности.** Примерно в 15% всех случаев наркомании диагностируется наличие психических расстройств. Кроме того, у значительного числа наркоманов выраженные психопатические черты характера.





ПРИВЫКАНИЕ

Привыкание к таким сильнодействующим наркотическим средствам, как морфин, кокаин, героин и др. обычно сочетается с пристрастием, т.е. **непреодолимым стремлением больного прибегнуть к новому приему этих препаратов.** При повторном введении таких веществ в организм у больного возникает временное улучшение самочувствия. Но это ощущение быстро улетучивается, и наступает в буквальном смысле страшное похмелье. Потребность в наркотиках не проходит и даже не уменьшается. **Мало того, она возрастает: возникает психическая и все возрастающая зависимость от наркотика.**





ФАКТОРЫ

К факторам, способствующим началу приема наркотиков относятся:

- доступность наркотиков и их скрытая реклама;
- одобрительное отношение со стороны друзей к приему наркотических препаратов;
- обилие информации о действии препарата и источниках их получения;
- рост числа неблагополучных семей;
- неблагоприятная окружающая среда, действие некоторых мутагенов.

